

Vorgang: Zerlegung eines Buttersäureethylesters mittels Natronlauge

LV SV

Beschreibung: Ethylbutyrat (Ananasester) wird beim Erwärmen unter Einwirkung von verdünnter Natronlauge in Buttersäure und Ethanol aufgespalten. Nachweis der Säure erfolgt durch Leitfähigkeitsmessung und mit pH-Indikatorpapier.

Schadensrisiko:

durch Einatmen / Hautkontakt

durch Entzündung / Brand

Beteiligte Gefahrstoffe:

Ethylbutyrat [Achtung] GHS02

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Natronlauge (w=___% (>5%)) [Gefahr] GHS05

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung.



GHS02



GHS05

andere Stoffe:

wässrige Ethanol- und Buttersäure-Lösung

Substitutionsprüfung durchgeführt

Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch


Besondere Sicherheitshinweise:

Durch Rückflusskühlung für geschlossenes System sorgen!

Maßnahmen / Gebote:



Schutzbrille

Lüftungs-
maßnahmenBrandschutz-
maßnahmen

----- Schule

----- Lehrkraft

----- Unterschrift